IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D01	Allergia; Dispnea; Intossicazione; Trauma del collo	Ricorrenti	1; 2	Disfonia/disfagia/odinofagia	2	Insorte acutamente dopo il trauma
D02	Cefalea; Disturbo neurologico; Intossicazione; Sincope; Trauma cranio facciale	Ricorrenti	1; 2	Disturbi Neurologici	2	paresi, afasia/disartria, diplopia/disturbi del visus, parestesie/insensibilità, atassia
D03	Cefalea; Disturbi cognitivo/comportamentale; Disturbo neurologico; Febbre; Intossicazione; Trauma cranio facciale	Ricorrenti	1	Disturbi cognitivo comportamentali	2	grado “c” (confusion) nella scala ACVPU : disorientamento nello spazio, nel tempo o nella relazione con l’ambiente , amnesia (decine di minuti o ore), allucinazioni. Agitazione psicomotoria: eccitazione psichica con conseguenti disturbi comportamentali in
D04	Sincope	Ricorrenti	2	Dolore addominale o lombare	2	
D05	Cefalea; Sincope	Ricorrenti	1; 2	Cefalea ad insorgenza improvvisa	2	intensa, con acme del dolore raggiunto in pochissimi minuti (“come una pugnalata, come un fulmine a ciel sereno”)
D05-1-2	Dispnea	Avanzato	2	Allergia/anafilassi	2	
D06	Cardiopalmo; Sincope	Ricorrenti	2	Portatore ICD	2	
D06-1-2	Sincope	Avanzato	2	Insorgenza in clinostatismo	2	
D06-1-3	Sincope	Avanzato	2	Insorgenza durante sforzo	2	
D06-2-2	Sincope	Avanzato	2	Sincopi recidivanti nelle 24h	2	
D07	Cardiopalmo; Sincope	Avanzato	2	Emorragia significativa	2	
D08	Cardiopalmo; Dispnea; Dolore toracico/dorsale; Febbre; Sincope	Ricorrenti	2	NEWS =3 da singolo parametro	2	
D08-A1-1	Trauma cranio facciale	Specifici 2-3	1	Rischio ostruzione vie aeree	2	Sospettata in ogni trauma facciale importante con evidenti fratture o instabilità del massiccio facciale e in caso di emorragie copiose orali.
D08-A2-1	Trauma cranio facciale	Specifici 2-3	1	Due o più episodi di vomito	2	Correla con lesione intracranica traumatica

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D08-A3-1	Trauma cranio facciale	Specifici 2-3	1	Cefalea diffusa ed intensa (entro 72h)	2	Cefalea insorta entro 72 ore dal trauma: non vanno considerate le cefalee loco regionali nella sede del trauma o la cefalea di modesta entità.
D08-A4-1	Trauma cranio facciale	Specifici 2-3	1	Sospetta frattura della volta cranica	2	Deformità evidente o crepitazioni alla palpazione
D08-A4-2	Trauma cranio facciale	Specifici 2-3	1	Sospetta frattura della base cranica	2	Segno di BATTLE: ecchimosi retro mastoidea. Segno del PROCIONE: ecchimosi periorbitaria bilaterale con risparmio della parte palpebrale distale (tarsale). Rinorragia/Rinorrea e/o Otorragia/Emotimpano/Otorrea in assenza di ferite locali. Paralisi periferica del nervo facciale
D08-A4-3	Trauma cranio facciale	Specifici 2-3	1	Grave trauma del'occhio o occhio non valutabile per tumefazione	2	Ferite palpebrali estese Importante tumefazione periorbitaria che non permette l' esame del bulbo Evidenti lesioni del bulbo: avulsione, ferite penetranti, corpi estranei conficcati. Diplopia o evidente diminuzione dell'acuità visiva. Anisocoria non preesistente
D08-B1-1	Trauma del collo	Specifici 2-3	1	Ematoma del collo	2	Ematoma post traumatico del collo
D08-C1-1	Trauma della colonna	Specifici 2-3	1	Distubo neurologico da danno midollare	2	Paresi, plegia, parestesie: deficit sensitivi o motori, in genere, ma non necessariamente, simmetrici.Alterazione della sensibilità (parestesie o anestesia) della zona perineale e/o alterazioni della motilità sfinterica (incontinenza/ritenzione urinaria)
D08-D1-1	Trauma addominale	Specifici 2-3	1	Dolore addominale spontaneamente riferito	2	
D08-E1-1	Emorragia\Ferita	Specifici 2-3	1	Macroematuria	2	
D08-E2-1	Emorragia\Ferita	Specifici 2-3	1	Emorragia Vaginale	2	
D08-E3-1	Emorragia\Ferita	Specifici 2-3	1	Ferita penetrante prossimale	2	in sede capo, collo, torace, addome o coinvolgente settori prossimali al terzo medio del braccio o della coscia, solitamente causate da arma da fuoco, arma bianca o corpi estranei (CE) conficcati. Ricomprendi eviscerazione
D08-E4-1	Emorragia\Ferita	Specifici 2-3	1	Grave emorragia esterna	2	sanguinamento significativo e persistente o arrestato da tourniquet o simili.

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D08-F1-1	Trauma degli arti	Specifici 2-3	1	Amputazioni del polso o della caviglia o più prossimali	2	Amputazione prossimale rispetto alle dita della mano o del piede. Necessita di stabilizzazione urgente e successiva risposta operativa.
D08-F2-1	Trauma degli arti	Specifici 2-3	1	Deformità sospette per lussazione del gomito o caviglia o più prossimali	2	ARTO SUPERIORE: al GOMITO o prossimale ad esso.
D08-F3-1	Trauma degli arti	Specifici 2-3	1	Deformità sospette per frattura del gomito o caviglia o più prossimali	2	ARTO SUPERIORE: al GOMITO o prossimale ad esso.
D08-F4-1	Trauma degli arti	Specifici 2-3	1	Sospetta frattura esposta del gomito o caviglia o più prossimali	2	ARTO SUPERIORE: al GOMITO o prossimale ad esso. ARTO INFERIORE: alla CAVIGLIA o prossimale ad essa.
D08-F5-1	Trauma degli arti	Specifici 2-3	1	Sospetta frattura isolata del collo del femore	3A	Arto inferiore accorciato ed extraruotato, in assenza di deformità.
D08-F6-1	Trauma degli arti	Specifici 2-3	1	Amputazioni distali rispetto a polso o caviglia	3A	Amputazione di una o più dita della mano o del piede.
D08-G1-1	Ustioni	Specifici 2-3	1	Ustioni termiche di 2°-3° estese (≥18% della superficie cutanea) negli adulti	2	
D08-G2-1	Ustioni	Specifici 2-3	1	Ustioni termiche di 2°-3° coinvolgenti mani o piedi o genitali	2	
D08-G3-1	Ustioni	Specifici 2-3	1	Ustione al volto/ vie aeree	2	Con associato disfonia/ disfagia/ odinofagia o tosse stizzosa; presenza di particelle di carbone nell'escreato o nella saliva; ustioni del cavo orale o al volto (visibili attorno alla bocca o alle narici).
D08-G4-1	Ustioni	Specifici 2-3	1	Chimiche	2	Recentissime, non ancora decontaminate.
D08-G6-1	Ustioni	Specifici 2-3	1	Elettriche	2	Folgorazioni o elettrocuzioni. Possono provocare danni più estesi di quanto appare in superficie o danni sistemici (alterazioni ECG).
D08-H1-1	Ferita	Specifici 2-3	1	Ferite penetranti da arma bianca, arma da fuoco o corpo estraneo conficcato del capo/collo/tronco o terzo prossimale del braccio o della coscia	2	
D08-H2-1	Ferita	Specifici 2-3	1	Grave emorragia esterna	2	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D08-I10-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Ribaltamento del veicolo	3A	
D08-I1-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Pedone, ciclista, motociclista o su mezzo aperto investito da mezzo con velocità ≥ 30 Km/h	3A	
D08-I11-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Caduta da > 3 metri indifferentemente dalla posizione (di piedi o di vertice); ruzzolato dalle scale.	3A	
D08-I2-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Pedone, ciclista o motociclista o su mezzo aperto arrotato.	3A	
D08-I3-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Scontro autoveicolo ≥ 70 km/h	3A	
D08-I4-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Ciclista, motociclista o su mezzo aperto a velocità ≥ 30 km/h.	3A	
D08-I5-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Proiettato al di fuori di un veicolo chiuso	3A	
D08-I6-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Ciclista, motociclista o su mezzo aperto con separazione del conducente dal mezzo (sbalzato).	3A	
D08-I7-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Deformazione dell'abitacolo	3A	
D08-I8-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Da estricare	3A	
D08-I9-1	Trauma dinamica	Specifici 2-3	1	Decesso del passeggero nello stesso veicolo	3A	
D08-L1-1	Trauma fattori fisiopatologici	Specifici 2-3	1	Emofilia\von Willebrand	2	
D08-L2-1	Trauma fattori fisiopatologici	Specifici 2-3	1	Trauma addome e bacino gravida	3A	
D08-L3-1	Trauma fattori fisiopatologici	Specifici 2-3	1	età ≥ 75 anni	3A	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D08-L4-1	Trauma fattori fisiopatologici	Specifici 2-3	1	Altra diatesi emorragica	3A	Positività anamnestica per coagulopatia congenita (Emofilia, Rendu-Osler , Von Willebrand) o acquisita (piastrinopenia, leucemia, cirrosi epatica ecc.). Terapia anticoagulante (eparina, fondaparinux o anticoagulanti orali) o doppia antiaggregazione. Coesistenza di più foci emorragiche o di un focus emorragico con manifestazioni purpuriche.
D09	Cardiopalmo; Dispnea; Dolore toracico/dorsale; Febbre; Sincope	Ricorrenti	2	NEWS ≥ 5	2	
D09-0-NS	Dolore toracico/dorsale	Specifico 4-5	1	Dolore toracico senza discriminatori non sofferente	4	
D09-0-S	Dolore toracico/dorsale	Specifico 3B	1	Dolore toracico senza discriminatori sofferente	3B	
D09-1-1	Dolore toracico/dorsale	Specifici 2-3	1	Sintomatologia tipica per SCA	2	Dolore retrosternale costrittivo o gravativo, talora irradiato alle spalle, braccia, collo, mandibola, epigastrio, della durata di almeno 2 minuti. Può essere associato a sudorazione fredda. È considerato tipico anche il dolore avvertito come simile al pregresso infarto nel paziente con cardiopatia post infartuale
D09-1-2	Dolore toracico/dorsale	Specifici 2-3	2	ECG significativo	2	
D09-2-1	Dolore toracico/dorsale	Specifici 2-3	1	Sintomatologia tipica per DA	2	Dolore lacerante o trafittivo improvviso, interscapolare o retrosternale con intensità massima già all'esordio.
D09-3-1	Dolore toracico/dorsale	Specifici 2-3	1	Fattori di rischio per cardiopatia ischemica	2	età ≥45 anni; nota cardiopatia ischemica (IMA, PTCA, BPAC) assunzione recente di cocaina; ipertensione arterios; diabet; ipercolesterolemia obesità grave tabagismo (compresa sigaretta elettronica) familiarità per cardiopatia ischemica nei parenti di primo grado prima dei 65 anni

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D09-4-1	Dolore toracico/dorsale	Specifici 2-3	1	Fattori di rischio per dissezione aortica	2	sdr Marfan valvulopatia aortica (valvola aortica bicuspide, protesi valvolare, ...) aneurisma dell'aorta toracica (anche già operato) manipolazione aortica nell'ultimo mese (coronarografia, By-pass coronarico) familiarità per malattia aortica (dissezio, ...), gravidanza, puerperio (< 3° mese)
D09-5-1	Dolore toracico/dorsale	Specifici 2-3	1	Fattori di rischio per embolia polmonare	2	Anamnesi positiva per trombosi venosa profonda (TVP) arti inferiori o pregressa embolia polmonare o trombofilia gravidanza, puerperio (6 settimane) terapia estro-progestinica (compresi cerotto o anello vaginale) recente (< 1 mese) intervento chirurgico/ortopedico maggiore patologia oncologica attiva o guarita di recente (< 1 anno) recente (< 1 mese) immobilizzazione a letto (> 3 gg) o distrettuale (presenza o mantenimento di gesso o di dispositivo di immobilizzazione permanente) recente (< 1 mese) viaggio con prolungato (>6 ore) mantenimento della posizione seduta/stesa dolore/edema monolaterale arto inferiore emottisi (anche lieve).
D10	Cardiopalmo; Dispnea; Dolore toracico/dorsale; Febbre; Sincope	Ricorrenti	2	NEWS <5 e nessuno dei precedenti	3A	
D10-0-1NS	Dolore addominale/pelvico	Specifico 4-5	1	Dolore addominale/pelvico/lombare non sofferente	4	
D10-0-1-S	Dolore addominale/pelvico	Specifico 3B	1	Dolore addominale/pelvico/lombare sofferente	3B	
D10-1-1	Dolore addominale/pelvico; Dolore lombare meccanico	Ricorrenti	1	Anamnesi positiva per aneurisma aortico	2	Aneurisma aortico noto, semplice o dissecante, anche già operato.
D10-2-1	Dolore addominale/pelvico	Specifici 2-3	1	Dolore testicolare (<24H)	3A	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D10-3-1	Dolore addominale/pelvico	Specifici 2-3	1	Donna monovarica in età fertile	3A	
D10-4-1	Dolore lombare meccanico	Specifici 2-3	1	Ritenzione o incontinenza urinaria, incontinenza fecale, ipo/anestesia “a sella"	3A	Possono essere indicativi di sindrome della cauda equina, che è un’urgenza neurochirurgica. Il paziente può riferire difficoltà ad iniziare la minzione pur avvertendo lo stimolo, o lamentare ritenzione urinaria con gemizio incontrollato (iscuria paradossa), o rilascio incontrollato di feci. L’ipo/anestesia coinvolge la zona perineale o la parte inferiore dei glutei (sostanzialmente l’area che si appoggia sulla sella della bicicletta).
D11	Cardiopalmo; Dispnea; Sincope	Ricorrenti	2	ECG significativo (eseguire solo se FC<60 o >100 e/o dolore toracico)	2	
D11-0-1NS	Cefalea	Specifico 4-5	1	Cefalea non sofferente	4	
D11-0-1S	Cefalea	Specifico 3B	1	Cefalea sofferente	3B	
D11-1-1	Cefalea	Specifici 2-3	1	Dolore acuto oculare e periorbitario acuto e severo con arrossamento congiuntivale	3A	Suggestivo per glaucoma acuto chiuso
D12	Cefalea; Disturbi cognitivo/comportamentale; Disturbo neurologico; Dolore addominale/pelvico; Dolore toracico/dorsale	Ricorrenti	1	Gravidanza >20° settimana di gestazione	2	Suggerisce Pre-eclampisa
D12-0-1NS	Disturbo neurologico	Specifico 4-5	1	Disturbi Neurologici non sofferente	4	
D12-0-1S	Disturbo neurologico	Specifico 3B	1	Disturbi Neurologici sofferente	3B	
D12-1-1	Disturbo neurologico	Specifici 2-3	1	esordio in tempo utile per la riperfusione	2	Finestra temporale utile per le procedure di riperfusione (trombolisi/trombectomia)in caso di ictus ischemico. Variabile in base alla realtà locale e codificata nei PDTA specifici. Se ictus al risveglio, si calcola come esordio il punto di mezzo tra quando il paziente è stato visto sano per l'ultima volta e l'ora del risveglio con sintomi.

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D12-2-1	Disturbi cognitivo/comportamentale; Disturbo neurologico	Ricorrenti	1	Cefalea	2	
D13	Dispnea; Emorragia non traumatica; Emorragia\Ferita	Ricorrenti	1; 2	Emottisi importante	2	Emissione di sangue dalle vie respiratorie di grado tale da poter determinare sintomi da possibile impegno delle prime vie aeree (tosse insistente in corso di emottisi, sensazione di soffocamento).
D13-0-1NS	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifico 4-5	1	Disturbi cognitivo/comportamentali non sofferente	4	
D13-0-1S	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifico 3B	1	Disturbi cognitivo/comportamentali sofferente	3B	
D13-1-1	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifici 2-3	1	Violenza verso sé stessi o altri	3A	
D13-2-1	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifici 2-3	1	in atto con febbre	2	
D13-4-1	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifici 2-3	1	in atto con diabete	2	Può essere indicativo di ipoglicemia/iperglicemia, che necessita di correzione urgente.
D13-5-1	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifici 2-3	1	in atto con intossicazione	2	Intossicazione da farmaci, gas ambientali, composti chimici, funghi velenosi.
D13-6-1	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifici 2-3	1	in atto con cirrosi	2	Può essere indicativo di encefalopatia epatica.
D13-7-1	Disturbi cognitivo/comportamentale	Specifici 2-3	1	Grave disturbo cognitivo comportamentale	2	Paziente ancora contattabile ma delirante e con importante agitazione (a titolo esemplificativo, può presentare: forza sproporzionata, resistenza al dolore, comportamento violento o erratico, nudità o abbigliamento inappropriato alle condizioni ambientali, necessità di coinvolgimento delle forze dell'ordine sul territorio per comportamento distruttivo o bizzarro, resistenza crescente alle forze dell'ordine).
D14	Emorragia non traumatica; Emorragia\Ferita	Ricorrenti	1	Ematemesi	2	Ematemesi (vomito di sangue rosso o a fondi di caffè)

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D14-0-1NS	Intossicazione	Specifico 4-5	1	Intossicazione non sofferente	4	
D14-0-1S	Intossicazione	Specifico 3B	1	Intossicazione sofferente	3B	
D14-1-1	Intossicazione	Specifici 2-3	1	contatto mucoso/cutaneo	2	Necessità di decontaminazione richiedente lavaggio immediato (non utilizzare tale discriminatore se il paziente è già stato decontaminato in precedenza).
D14-2-1	Intossicazione	Specifici 2-3	1	Tossici	2	Tossici specifici: sostanze che per assunzione o per contatto sono pericolose di per sé e quindi impongono un monitoraggio ospedaliero del paziente, anche se non sono (ancora) comparsi i disturbi specificamente correlati. Si comprendono nella voce "tossici specifici" anche tutte le sostanze di cui non si conosca l'effetto a breve termine nell'ospite. Si riporta seguito un elenco, certamente non esaustivo, delle sostanze che appartengono a questa categoria, suddividendole nei seguenti gruppi • Farmaci (contatto enterale o parenterale): barbiturici, antidepressivi triciclici, litio, antiaritmici(beta bloccanti- calcio antagonisti), digitale, teofillina, paracetamolo, salicilati, insulina, ipoglicemizzanti orali, anticoagulanti • Gas ambientali (contatto soprattutto inalatorio/mucoso con solventi, combustibili, propellenti): monossido di carbonio, alcuni idrocarburi (ossido nitrico e fosgene) gas industriali (ammoniaca, cloro, ac. solforico, ac. nitrico, ac. fluoridrico, formaldeide, ossidi di azoto, cianuro d'idrogeno, idrocarburi volatili, metano), fumi d'incendio • Composti di uso agricolo o domestico (contatto enterale e/o muco-cutaneo): caustici (acidi: acido muriatico, acido solforico; alcalini: ammoniaca, ipocloriti, soda caustica), tensioattivi (ammorbidenti, detersivi per lavastoviglie), disinfettanti (in particolare acido borico), vernici e solventi (tricoloetilene, toluene, acquaragia), benzine e petroli, insetticidi e pesticidi• Funghi e vegetali: oleandro, belladonna, erba del diavolo (stramonio), bosso, colchico. • Ingestione di ovuli di sostanze stupefacenti

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D14-3-1	Intossicazione	Specifici 2-3	1	farmaci in dose sovraterapeutica	2	Sostanze che, per assunzione, contatto o inalazione, hanno una tossicità significativa (compresi farmaci a dosaggio sovraterapeutico). Impongono un monitoraggio ospedaliero del paziente, anche se non sono (ancora) comparsi i disturbi specificamente correlati. Si comprendono nella voce “tossici” anche tutte le sostanze di cui non si conosca l’effetto a breve termine nell’ospite.
D15	Emorragia non traumatica; Emorragia\Ferita	Ricorrenti	1	Melena/enterorragia profusa e persistente	2	Melena (feci picee); enterorragia profusa e persistente (emissione di sangue più o meno scuro, commisto o verniciante le feci, di entità e durata tali da poter causare alterazione emodinamica).
D15-0-1NS	Allergia	Specifico 4-5	1	Allergia/anafilassi non sofferente	5	
D15-0-1S	Allergia	Specifico 3B	1	Allergia/anafilassi sofferente	3B	
D15-1-1	Allergia	Specifici 2-3	1	orticaria in rapida diffusione (<2 ore)	3A	Rapida estensione ed aggravamento delle manifestazioni cutanee orticarioidi nella prima ora.
D15-2-1	Allergia	Specifici 2-3	1	vomito diarrea (<2h)	3A	
D15-3-1	Allergia	Specifici 2-3	1	precedente episodio di shock anafilattico	3A	Positività anamnestica per precedenti gravi manifestazioni allergiche (ostruzione delle prime vie aeree, crisi d’asma, shock anafilattico, arresto cardiorespiratorio).
D15-4-1	Allergia	Specifici 2-3	1	Dolore addominale (<2h)	3A	
D16	Emorragia non traumatica; Febbre	Ricorrenti	1	Porpora con febbre	2	Manifestazione emorragica cutanea, comprendente anche le petecchie, identificabile da macchie violacee che possono essere palpabili o meno e non schiariscono alla digitopressione. Associata a febbre è indicativa di possibile sepsi meningococcica. >> Risposta operativa: si raccomanda di indossare la mascherina chirurgica e isolare il paziente.
D16-0-1NS	Emorragia non traumatica	Specifico 4-5	1	Emorragia non sofferente	5	
D16-0-1S	Emorragia non traumatica	Specifico 3B	1	Emorragia sofferente	3B	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D16-1-1	Emorragia non traumatica; Gravidanza/puerperio	Ricorrenti	1	Metrorragia gravidanza >20° settimana di gestazione o puerperio (<6 settimane)	2	Nella gravida >20 SG può sottendere un distacco di placenta o placenta previa. Nel puerperio può indicare in primis ritenzione di tessuto placentare.
D16-2-1	Emorragia non traumatica	Specifici 2-3	1	Malattia emorragica congenita	2	Positività anamnestica per coagulopatia congenita (Emofilia, Rendu-Osler , Von Willebrand) o acquisita (piastrinopenia, leucemia, cirrosi epatica ecc.). Terapia anticoagulante (eparina, fondaparinux o anticoagulanti orali) o doppia antiaggregazione. Coesistenza di più foci emorragici o di un focus emorragico con manifestazioni purpuriche.
D16-2-2	Emorragia non traumatica	Specifici 2-3	1	Altra diatesi emorragica	3A	1- Disturbi dell'emostasi: acquisiti: da cirrosi epatica, porpora trombotica trombocitopenica, piastrinopenia da farmaci etc. iatrogeni: Doppia anti aggregazione [Aspirina + (Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor)] Anticoagulanti orali (VKA o DOAC) Eparina o Fondaparinux. 2- Coesistenza di più foci emorragiche o di un focus emorragico conmanifestazioni purpruriche
D17	Cefalea; Disturbi cognitivo/comportamentale; Disturbo neurologico; Dolore addominale/pelvico; Dolore toracico/dorsale	Ricorrenti	1	Puerperio (<6 settimane)	2	Suggerisce Pre-eclampisa
D17-0-1NS	Febbre	Specifico 4-5	1	Febbre non sofferente	4	
D17-0-1S	Febbre	Specifico 3B	1	Febbre sofferente	3B	
D17-1-1	Febbre	Specifici 2-3	1	Immunocompromesso	2	Neutropenia (<500), asplenia, immunosopressione, pazienti trapiantati, AIDS conclamato, neoplastici in chemioterapia, immunodepressione congenita
D17-2-1	Febbre	Specifici 2-3	1	Lesione cutanea con dolore severo	2	Il dolore è intenso e talora sproporzionato rispetto alla lesione cutanea visibile.
D17-3-1	Febbre	Specifici 2-3	1	Edema periorbitario	3A	Edema e rossore delle palpebre e del tessuto periorbitario (possibile cellulite retro orbitaria).
D17-4-1	Febbre; Gravidanza/puerperio	Ricorrenti	1	TC ≥38°C IN GRAVIDA > 20 SG	2	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D18-0-1NS	Dolore acuto ad un arto	Specifico 4-5	1	Dolore arto non traumatico non sofferente	5	
D18-0-1S	Dolore acuto ad un arto	Specifico 3B	1	Dolore arto non traumatico sofferente	3B	
D18-1-1	Dolore acuto ad un arto	Specifici 2-3	1	arto freddo, pallido/cianotico/marezzato	3A	Ipotermico rispetto al controlaterale, pallido o cianotico o marezzato. Suggestivo per ischemia acuta dell'arto.
D19-0-1NS	Gravidanza/puerperio	specifico 4-5	1	Gravidanza non sofferente	5	
D19-0-1S	Gravidanza/puerperio	Specifico 3B	1	Gravidanza sofferente	3B	
D19-1-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Cefalea e/o ipertensione >20° settimana di gestazione o puerperio (<6 settimane)	2	Suggestive di preeclampsia. La PAO riferita/riportata deve essere ≥140/90 mmHg.
D19-2-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Disturbi neurologici >20° settimana di gestazione o puerperio (<6 settimane)	2	Nuova insorgenza, in assenza di trauma, di: diplopia/emianopsia/amaurosi/scotoma; afasia/disartria; paresi/plegia; parestesie/insensibilità; clonie; incapacità di mantenere la stazione eretta o di marciare. Suggestivo di preeclampsia.
D19-3-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Disturbi cognitivo-comportamentali >20° settimana di gestazione o puerperio (<6 settimane)	2	Grado A (Alert) o “C” (Confusion) nella scala ACVPU; il paziente presenta disturbi ad insorgenza acuta e recente quali: alterazione del sensorio: deterioramento/alterazione riferita (non in atto) dello stato di coscienza; stato confusionale: amnesia (decine di minuti o ore), disorientamento temporo/spaziale o nella relazione con l’ambiente, allucinazioni. alterazione psicomotoria: eccitazione psichica (agitazione psicomotoria) o deflessione del tono dell’umore, con conseguenti disturbi comportamentali, in pz contattabile dal triagista. Suggestivo di preeclampsia.
D19-4-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Dolore addominale ad insorgenza acuta >20° settimana di gestazione o puerperio (<6 settimane)	2	Nella gravida >20 SG può sottendere un distacco di placenta

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D19-5-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	CONTRAZIONI UTERINE DI INTENSITÁ CRESCENTE	2	Dolore di tipo colico, di intensità crescente spesso indicative di inizio di travaglio (a termine o pretermine), tuttavia presenti anche nel distacco di placenta, rottura uterina, infezione intra amniotica o delle vie urinarie.
D19-6-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Rottura delle mebrane con riferita massa/pulsazione in vagina	2	Suggerisce come diagnosi più probabile il prolasso del funicolo ombelicale (cordone ombelicale), emergenza ostetrica per rischio elevato di compromissione fetale a causa della pressione esercitata dal peso del feto sul funicolo , tale da comprimerlo, contro le pareti del canale vaginale.
D19-7-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Movimenti fetali diminuiti o assenti	2	Percezione materna di assenza o riduzione della frequenza e/o della intensità dei movimenti fetali.
D19-9-1	Gravidanza/puerperio	Specifici 2-3	1	Parto extraospedaliero	2	Parto avvenuto al di fuori del contesto ospedaliero. Richiede rapida valutazione del neonato e della puerpera.
D20-1-1	Altro urgente	Specifici 2-3	1	Alto rischio evolutivo	2	In paziente asintomatico, riscontro di iperkaliemia agli esami ematochimici; ECG o ECG Holter, eseguiti per controllo, con positività per SCA; TAC cerebrale positiva per lesione acuta; angioTC polmonare suggestiva per embolia polmonare acuta; …
D20-2-1	Altro urgente	Specifici 2-3	1	Basso rischio evolutivo	3A	In paziente asintomatico, disturbi minori insorti dopo immersione con autorespiratori; morsi, punture di animali esotici, ragni, serpenti,...
D21-10-1NS	Problemi Generali	Specifico 4-5	1	Iperglicemia	4	
D21-10-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Iperglicemia	3B	
D21-11-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Ipertensione arteriosa	5	
D21-11-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Ipertensione arteriosa	3B	
D21-1-1NS	Problemi Generali	Specifico 4-5	1	Astenia	4	
D21-1-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Astenia	3B	
D21-12-1NS	Problemi Generali	Specifico 4-5	1	Ittero	4	
D21-12-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Ittero	3B	
D21-13-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Nausea e/o vomito	5	
D21-13-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Nausea e/o vomito	3B	
D21-14-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Singhiozzo	5	
D21-14-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Singhiozzo	3B	
D21-15-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Tosse e/o raffreddore	5	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D21-15-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Tosse e/o raffreddore	3B	
D21-16-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Tremori	5	
D21-16-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Tremori	3B	
D21-17-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Vertigine e/o Capogiro	5	
D21-17-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Vertigine e/o Capogiro	3B	
D21-18-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Alterazioni esami bioumorali	5	
D21-18-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Alterazioni esami bioumorali	3B	
D21-19-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Caso sociale asintomatico	5	
D21-19-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Caso sociale asintomatico	3B	
D21-2-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Ansia e/o depressione	5	
D21-2-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Ansia e/o depressione	3B	
D21-3-1NS	Problemi Generali	Specifico 4-5	1	Corpo estraneo ingerito	4	
D21-3-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Corpo estraneo ingerito	3B	
D21-4-1NS	Problemi Generali	Specifico 4-5	1	Corpo estraneo rettale	4	
D21-4-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Corpo estraneo rettale	3B	
D21-5-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Disturbi dell'alvo	5	
D21-5-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Disturbi dell'alvo	3B	
D21-6-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Disturbi della minzione	5	
D21-6-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Disturbi della minzione	3B	
D21-7-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Edema agli arti	5	
D21-7-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Edema agli arti	3B	
D21-8-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Emorroidi	5	
D21-8-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Emorroidi	3B	
D21-9-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Dolore anale	5	
D21-9-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Dolore anale	3B	
D22-0-1NS	Problemi oculistici	specifico 4-5	1	Altro oculistico	5	
D22-0-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Altro oculistico	3B	
D22-1-1NS	Problemi oculistici	specifico 4-5	1	Sensazione di CE oculare	5	
D22-1-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Sensazione di CE oculare	3B	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D22-2-1NS	Problemi oculistici	specifico 4-5	1	Edema palpebrale non traumatico	5	
D22-2-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Edema palpebrale non traumatico	3B	
D22-3-1NS	Problemi oculistici	specifico 4-5	1	Calazio	5	
D22-3-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Calazio	3B	
D22-4-1NS	Problemi oculistici	Specifico 4-5	1	Difetto di lacrimazione	5	
D22-4-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Difetto di lacrimazione	3B	
D22-5-1NS	Problemi oculistici	Specifico 4-5	1	Emorragia congiuntivale non traumatica	5	
D22-5-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Emorragia congiuntivale non traumatica	3B	
D22-6-1NS	Problemi oculistici	Specifico 4-5	1	Arrossamento congiuntivale	5	
D22-6-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Arrossamento congiuntivale	3B	
D22-7-1NS	Problemi oculistici	Specifico 4-5	1	Fosfeni	5	
D22-7-1S	Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Fosfeni	3B	
D22-8-1NS	FT oculistici; Problemi oculistici	Specifico 4-5	1	Miodesopsie	5	
D22-8-1S	FT oculistici; Problemi oculistici	Specifico 3B	1	Miodesopsie	3B	
D22-FT1-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Sensazione di CE	5	
D22-FT2-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Edema palpebrale non traumatico	5	
D22-FT3-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Calazio	5	
D22-FT4-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Difetto di lacrimazione	5	
D22-FT5-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Emorragia congiuntivale non traumatica	5	
D22-FT6-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Arrossamento congiuntivale	5	
D22-FT7-1	FT oculistici	Specifici FT	1	Fosfeni/Miodesopsie	5	
D23-0-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	specifico 4-5	1	Altro ORL/Odonto/Maxillo	5	
D23-0-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Altro ORL/Odonto/Maxillo	3B	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D23-1-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	specifico 4-5	1	Otalgia	5	
D23-1-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Otalgia	3B	
D23-2-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 4-5	1	Corpo estraneo coane, orecchio, cavo orale	4	
D23-2-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Corpo estraneo coane, orecchio, cavo orale	3B	
D23-3-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	specifico 4-5	1	Odontalgia	5	
D23-3-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Odontalgia	3B	
D23-4-1NS	Problemi Generali	specifico 4-5	1	Dolore al collo	5	
D23-4-1S	Problemi Generali	Specifico 3B	1	Dolore al collo	3B	
D23-5-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	specifico 4-5	1	Dolore alla gola	5	
D23-5-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Dolore alla gola	3B	
D23-6-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	specifico 4-5	1	Ipoacusia	5	
D23-6-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Ipoacusia	3B	
D23-7-1NS	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	specifico 4-5	1	Acufeni	5	
D23-7-1S	Problemi otoiatrici/odontoiatrici/ maxillofacciali	Specifico 3B	1	Acufeni	3B	
D23-FT1-1	FT ORL	Specifici FT	1	Otalgia	5	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D23-FT2-1	FT ORL	Specifici FT	1	Corpo estraneo coane, orecchio, cavo orale	5	
D23-FT3-1	FT ORL	Specifici FT	1	Odontalgia	5	
D23-FT4-1	FT ORL	Specifici FT	1	Dolore al collo	5	
D23-FT5-1	FT ORL	Specifici FT	1	Dolore alla gola	5	
D23-FT6-1	FT ORL	Specifici FT	1	Ipoacusia	5	
D23-FT7-1	FT ORL	Specifici FT	1	Acufeni	5	
D24-0-1NS	Problemi ginecoloigici	specifico 4-5	1	Altro ginecologico	5	
D24-0-1S	Problemi ginecoloigici	Specifico 3B	1	Altro ginecologico	3B	
D24-1-1NS	Problemi ginecoloigici	specifico 4-5	1	Edema, prurito, secrezione o dolore vaginale/vulvare	5	
D24-1-1S	Problemi ginecoloigici	Specifico 3B	1	Edema, prurito, secrezione o dolore vaginale/vulvare	3B	
D24-2-1NS	Problemi ginecoloigici	Specifico 4-5	1	Corpo estraneo vaginale	4	
D24-2-1S	Problemi ginecoloigici	Specifico 3B	1	Corpo estraneo vaginale	3B	
D24-3-1NS	Problemi ginecoloigici	specifico 4-5	1	Amenorrea e/o alterazioni mestruali	5	
D24-3-1S	Problemi ginecoloigici	Specifico 3B	1	Amenorrea e/o alterazioni mestruali	3B	
D24-4-1NS	Problemi ginecoloigici	specifico 4-5	1	Perdite ematiche riferite non in atto	5	
D24-4-1S	Problemi ginecoloigici	Specifico 3B	1	Perdite ematiche riferite non in atto	3B	
D24-5-1NS	Problemi ginecoloigici	specifico 4-5	1	Richiesta di contraccezione	5	
D24-5-1S	Problemi ginecoloigici	Specifico 3B	1	Richiesta di contraccezione	3B	
D24-FT1-1	FT Ginecologici	Specifici FT	1	Edema, secrezione o dolore vaginale o vulvare	5	
D24-FT2-1	FT Ginecologici	Specifici FT	1	Corpo Estraneo vaginale	5	
D24-FT3-1	FT Ginecologici	Specifici FT	1	Condilomi	5	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D24-FT4-1	FT Ginecologici	Specifici FT	1	Richiesta di Contraccezione	5	
D24-FT5-1	FT Ginecologici	Specifici FT	1	Ritardo di ciclo	5	
D25-0-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Altro dermatologico	5	
D25-0-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Altro dermatologico	3B	
D25-1-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Cisti suppurate	5	
D25-1-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Cisti suppurate	3B	
D25-2-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Corpo estraneo cute	5	
D25-2-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Corpo estraneo cute	3B	
D25-3-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Esantema non febbrile	5	
D25-3-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Esantema non febbrile	3B	
D25-4-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Morso o puntura d'insetto	5	
D25-4-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Morso o puntura d'insetto	3B	
D25-5-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Protuberanze o masse cutanee	5	
D25-5-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Protuberanze o masse cutanee	3B	
D25-6-1NS	Problemi dermatologici	specifico 4-5	1	Eritema o prurito localizzato	5	
D25-6-1S	Problemi dermatologici	Specifico 3B	1	Eritema o prurito localizzato	3B	
D25-FT0-1	FT dermatologici	Specifici FT	1	Altro dermatologico	5	
D25-FT1-1	FT dermatologici	Specifici FT	1	Cisti suppurate	5	
D26-0-1NS	Procedure	specifico 4-5	1	Altro procedure	5	
D26-0-1S	Procedure	Specifico 3B	1	Altro procedure	3B	
D26-1-1NS	Procedure	Specifico 4-5	1	Completamento accertamenti	4	
D26-1-1S	Procedure	Specifico 3B	1	Completamento accertamenti	3B	

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D26-2-1NS	Procedure	Specifico 4-5	1	Accertamenti medico-legali	4	
D26-2-1S	Procedure	Specifico 3B	1	Accertamenti medico-legali	3B	
D26-3-1NS	Procedure	Specifico 4-5	1	Controllo medico previsto	4	
D26-3-1S	Procedure	Specifico 3B	1	Controllo medico previsto	3B	
D26-4-1NS	Procedure	Specifico 4-5	1	Medicazioni	4	
D26-4-1S	Procedure	Specifico 3B	1	Medicazioni	3B	
D26-5-1NS	Procedure	specifico 4-5	1	Certificazioni (INAIL,INPS,Procedure rischio biologico)	5	
D26-5-1S	Procedure	Specifico 3B	1	Certificazioni (INAIL,INPS,Procedure rischio biologico)	3B	
D27-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma insignificante rispetto alla forze coinvolte a prescidenre dalla sede interessata 2 Un traumatismo non particolarmente violento localizzato esclusivamente ad una estremità	5	
D27-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma insignificante rispetto alla forze coinvolte a prescidenre dalla sede interessata 2 Un traumatismo non particolarmente violento localizzato esclusivamente ad una estremità	3B	
D28-0-1NS	Trauma minore	Specifico 4	1	Trauma cranio facciale	5	Comprensivo di trauma con ferita non penetrante
D28-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma cranio facciale	3B	Comprensivo di trauma con ferita non penetrante
D29-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma del collo	5	Sia diretto che indiretto comprensivo di ferita superficiale
D29-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma del collo	3B	Sia diretto che indiretto comprensivo di ferita superficiale
D30-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma della colonna	5	Sia diretto che indiretto comprensivo di ferita superficiale
D30-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma della colonna	3B	Sia diretto che indiretto comprensivo di ferita superficiale

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D31-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma del torace	5	Comprensivo di trauma con ferita non penetrante
D31-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma del torace	3B	Comprensivo di trauma con ferita non penetrante
D32-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma dell'addome/pelvi	5	Comprensivo di trauma con ferita non penetrante
D32-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma dell'addome/pelvi	3B	Comprensivo di trauma con ferita non penetrante
D33-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma arto superiore prossimale	5	Dalla spalla al polso, Comprensivo di trauma con ferita non penetrante (escluse amputazioni)
D33-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma arto superiore prossimale	3B	Dalla spalla al polso, Comprensivo di trauma con ferita non penetrante (escluse amputazioni)
D33-1-1NS	Dolore lombare meccanico	Specifico 4-5	1	Dolore lombare meccanico non sofferente	5	
D33-1-1S	Dolore lombare meccanico	Specifico 3B	1	Dolore lombare meccanico sofferente	3B	
D34-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma arto superiore distale	5	Distalmente al polso comprensivo di trauma con ferita (escluse amputazioni)
D34-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma arto superiore distale	3B	Distalmente al polso comprensivo di trauma con ferita (escluse amputazioni)
D34-1-1NS	Emorragia non traumatica	Specifico 4-5	1	Emoftoe	4	Emissione a seguito di colpo di tosse di catarro misto a sangue
D34-1-1S	Emorragia non traumatica	Specifico 3B	1	Emoftoe	3B	Emissione a seguito di colpo di tosse di catarro misto a sangue
D35-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma arto inferiore prossimale	5	Dalla coscia alla caviglia comprensivo di trauma con ferita non penetrante (escluse amputazioni)
D35-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma arto inferiore prossimale	3B	Dalla coscia alla caviglia comprensivo di trauma con ferita non penetrante (escluse amputazioni)
D35-1-1NS	Dolore acuto ad un arto	Specifico 4-5	1	Necrosi ischemica distale	4	
D35-1-1S	Dolore acuto ad un arto	Specifico 3B	1	Necrosi ischemica distale	3B	
D36-0-1NS	Trauma minore	specifico 4-5	1	Trauma arto inferiore distale	5	Distalmente alla caviglia comprensivo di trauma con ferita(escluse amputazioni)
D36-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Trauma arto inferiore distale	3B	Distalmente alla caviglia comprensivo di trauma con ferita(escluse amputazioni)
D36-1-1NS	Dolore acuto ad un arto	Specifico 4-5	1	Tumefazione monolaterale	4	Gonfiore monolaterale con o senza segni di flogosi, esteso a tutto o parte dell'arto senza febbre riferita
D36-1-1S	Dolore acuto ad un arto	Specifico 3B	1	Tumefazione monolaterale	3B	Gonfiore monolaterale con o senza segni di flogosi, esteso a tutto o parte dell'arto senza febbre riferita
D37-0-1NS	Trauma minore	Specifico 4-5	1	Ustioni minori	4	Esclusi i discriminatori per ustione del trauma maggiore

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
D37-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Ustioni minori	3B	Esclusi i discriminatori per ustione del trauma maggiore
D38-0-1NS	Trauma minore	Specifico 4-5	1	Ferita superficiale non penetrante del capo, collo e tronco e arti prossimale, altre ferite distali	4	
D38-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Ferita superficiale non penetrante del capo, collo e tronco e arti prossimale, altre ferite distali	3B	
D40-0-1NS	Altro	specifico 4-5	1	Disturbi specifici non ricompresi nelle altre categorie non associati al sospetto di dubbio evolutivo	5	
D40-0-1S	Altro	Specifico 3B	1	Disturbi specifici non ricompresi nelle altre categorie non associati al sospetto di dubbio evolutivo	3B	
D41-0-1NS	Trauma minore	Specifico 4-5	1	Cefalea da trauma cranico (>72h e entro due settimane dall'evento)	4	
D41-0-1S	Trauma minore	Specifico 3B	1	Cefalea da trauma cranico (>72H e entro due settimane dall'evento)	3B	
DR0	Arresto cardio respiratorio	Ricorrenti	1	Arresto cardio respiratorio	1	Non risponde, non respira (o gasping), non ha polso
DR1	Distress Respiratorio	Ricorrenti	1	Rumori Respiratori Ispettivi	1	(russamento, stridore, sibili, rantoli)
DR2	Distress Respiratorio	Ricorrenti	1	Sforzo respiratorio ispettivo	1	(respiro rapido o con utilizzo dei muscoli accessori, eloquio ostacolato dallo sforzo respiratorio)
DR3	Distress Respiratorio	Ricorrenti	1	Depressione respiratoria: ventilazione quantitativamente e qualitativamente ridotta	1	(respiro superficiale o evidente bradipnea)

IDD	Presentazioni	Tipologia	Fase	Discriminatore	Livello	Note
DR4	Shock	Ricorrenti	1	Pallore e sudorazione fredda	1	Comporta la valutazione con mano su fronte o regione naso-labiale per sentire se la cute sudorante sia fredda. Possono essere indicativi di compromissione acuta del circolo.
DR5	Shock	Ricorrenti	1	Cianosi/marezzatura	1	
DR6	Alterazione del sensorio	Ricorrenti	1	VPU di ACVPU	1	
DR7	Alterazione del sensorio	Ricorrenti	1	Confuso e non contattabile	1	Il paziente si presenta confuso e non è contattabile perché severamente agitato

DEFINIZIONI DEI LIVELLI

1	ROSSO	Interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali
2	ARANCIO	Condizione stabile con alto rischio evolutivo
3A	GIALLO	Condizione stabile con basso rischio evolutivo o con possibile danno d'organo
3B	AZZURRO	Condizione stabile senza rischio evolutivo con alto grado di sofferenza
4	VERDE	Condizione stabile senza rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni specialistiche
5	BIANCO	Problema non urgente o di minima rilevanza clinica

Firma CAPANO GEMMA
Data 16-10-2026